

第2類
医薬品

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保存してください。

漢方薬

エルネースG



【使用上の注意】



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位（下腹部痛、痔、脱肛の痛みに服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【成分・分量】 本品1日量〔3包(1包1.5g)〕中

「日局」ト ウ キ……2.0g 「日局」タ イ ソ ウ……2.0g
「日局」ケ イ ヒ……2.0g 「日局」シャクヤク……2.5g
「日局」ショウキョウ……0.5g 「日局」カンゾウ……1.0g

上記生薬より得た当帰建中湯エキス粉末2800mgを含みます。
なお、添加物としてヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、二酸化ケイ素を含みます。

【効能・効果】 体力虚弱で、疲労しやすく血色のすぐれないものの次の諸症：
月経痛、月経困難症、月経不順、腹痛、下腹部痛、腰痛、痔、
脱肛の痛み、病後・術後の体力低下

【用法・用量】 次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用する。
（食間とは、食後2～3時間を指します。）

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	1 包	3 回
15歳未満 7 歳以上	2/3包	
7 歳未満 4 歳以上	1/2包	
4 歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出る場合がありますが、効果には変わりありませんので安心して服用してください。
- 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用すること。

*【お問い合わせ先】 伸和製薬株式会社 情報管理室

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町二丁目15番15号
電 話：0120-019-776
受付時間：9時から17時まで（土・日曜、祝日を除く）

販 売 元 **日邦薬品工業株式会社**
東京都渋谷区代々木3丁目46番16号
<https://www.nippo-yakuhin.jp/>



*発 売 元 **伸 和 製 薬 株 式 会 社**
東京都中央区日本橋人形町二丁目15番15号



製造販売元 **大峰堂薬品工業株式会社**
奈良県大和高田市根成柿574番地