

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

当帰四逆加呉茱萸生薑湯

(とうきしぎやくかごしゅゆしょうきょうとう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「傷寒論」に記載されている当帰四逆加呉茱萸生薑湯に準拠して製造された煎薬用の紙パック剤です。

使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)胃腸の弱い人。
 - (4)高齢者。
 - (5)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (6)次の症状のある人。：むくみ
 - (7)次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、腕力感、 筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能・効果]

手足の冷えを感じ、下肢が冷えると下肢又は下腹部が痛くなり易いものの次の諸症：
しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛。

[用法・用量]

大人（15才以上）は1包（1日量）につき水400mLを加えあまり強くない火にかけ200mLに煮つめ、紙袋とともに煎じがすを取り去り、食前1時間前又は食間空腹時に温服して下さい。小人（15才未満4才以上）は同様に煎じて食間空腹時に温服して下さい。

年 齢	1包(1日量) 煎じ液	1日服用回数	年 齢	1包(1日量) 煎じ液	1日服用回数
大人(15才以上)	全 量	3～2回 に分けて	15才未満7才以上	2/3量	3回に分けて
			7才未満4才以上	1/2量	
			4才未満	服用しないこと	

<用法及び用量に関する注意>


- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)用法・用量を厳守すること。

[成分・分量] [本品1包（1日量）23.5g中]

日本薬局方	ト	ウ	キ	3.0g	日本薬局方	カ	ン	ソ	ウ	2.0g		
日本薬局方	ケ	イ	ヒ	3.0g	日本薬局方	タ	イ	ソ	ウ	5.0g		
日本薬局方	シ	ャ	ク	ヤ	ク	3.0g	日本薬局方	ゴ	シ	ュ	ユ	1.5g
日本薬局方	モ	ク	ツ	ウ	3.0g	日本薬局方	シ	ョ	ウ	キ	ョウ	1.0g
日本薬局方	サ	イ	シ	ン	2.0g								

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。
- (4)煎じ薬は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用すること。



[問い合わせ先]

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0721-23-4193
受付時間 10:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
電 話 0120-149-931

製造販売元
東洋漢方製薬株式会社
〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号