

ロート製薬

和漢箋

わかんせん®

錠剤タイプ



原寸大

30錠 1日3回

ジャスミンの香り

# ルナエール

重い・だるい・しんどい…

生理症状<sup>※</sup>を

軽くしていく

- 生理痛<sup>※</sup>
- めまい
- 頭が重い
- むくみ<sup>など</sup>

当帰芍薬散は血の巡りを良くする漢方

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり  
疲労しやすく、ときには下腹部痛、頭重、  
めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴える方の  
月経不順<sup>※</sup>、月経異常<sup>※</sup>、月経痛<sup>※</sup>、めまい、頭重、むくみなどに

生薬のイラストはイメージです。

第2類医薬品 〈販売名〉ルナエール 30錠 1日3回



ココロ・Park:

ルナエールを飲んでいかが  
でしたか?あなたの感想を  
お届けください。  
<https://coco.rohto.com/luna/>



----- 切り取り線 -----

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりしめること **漢方製剤**

ルナエールは、漢方処方の当帰芍薬散です。当帰芍薬散は、全身の血行を良くすると同時に、体内の水の偏りを整える処方です。冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすい方の月経不順、月経異常、月経痛という生理時に起こる不調や、むくみ、めまい・立ちくらみ、(ズーンとした)頭重など血の巡りを良くして、あなたの身体に働きかけます。



### ⚠ 使用上の注意

#### 🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1)医師の治療を受けている人 (2)胃腸の弱い人 (3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

**【効能・効果】** 体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

**【用法・用量】** 次の量を1日3回食前又は食間に、水又はお湯で服用してください。

成人(15才以上)及び7才以上の小児…1回2錠、7才未満…服用しないこと

<用法・用量に関連する注意> (1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。※食間とは、食後2～3時間をさす。

**【成分・分量】** 6錠(2442mg)中 当帰芍薬散エキス(1/2量)1860mg(トウキ1.5g、センキュウ1.5g、シャクヤク3g、ブクリョウ2g、ビャクジュツ2g、タクシャ2gより抽出)を含む。添加物：結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、クロスCMC-Na、香料  
※本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります。

**【保管及び取扱い上の注意】** (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。(2)小児の手の届かないところに保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる) (4)湿気により、変色など品質に影響を与える場合がありますので、ぬれた手で触れないでください。(5)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

副作用被害救済制度の問合せ先:0120-149-931

**ロート製薬株式会社**

大阪市生野区巽西1-8-1

お客さま安心サポートデスク

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

使用  
期限

製造  
番号



17292421F