

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

## 【漢方薬】当帰芍薬散

### カイケツ®EP錠

第2類医薬品

販売名：カイケツEP錠

540錠

#### ⚠ 使用上の注意



##### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 胃腸の弱い人
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- 3ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

#### 【効能・効果】

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

#### 【用法・用量】

次の量を食前又は食間に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	6錠	3回
15歳未満 7歳以上	4錠	
7歳未満 5歳以上	3錠	
5歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

#### 【成分・分量】 18錠(3.6g)中

シャクヤク …… 1.44g  
センキュウ …… 1.08g  
タクシャ …… 1.44g  
トウキ …… 1.08g  
ビャクジュツ …… 1.44g  
ブクリョウ …… 1.44g

当帰芍薬散エキス  
(9/25量) …… 1.6g

シャクヤク末 …… 0.131g  
センキュウ末 …… 0.098g  
タクシャ末 …… 0.131g  
トウキ末 …… 0.098g  
ビャクジュツ末 …… 0.131g  
ブクリョウ末 …… 0.131g

添加物として軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、乳糖、バレイシヨデンブン、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります。効果に変わりはありません。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

販売元 PharmaX株式会社  
東京都文京区本郷5-25-18  
ハイテック本郷ビル102

お客様相談窓口: ☎03-4500-2141  
公式LINEではいつでも薬剤師に  
ご相談が可能です



製造販売元 劑盛堂薬品株式会社  
和歌山市太田二丁目8番31号

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931