

この説明文書は、服用前に必ずお読みください。
また、必要時に読めるよう保管してください。

第2類医薬品

販売名: 静寂箋 (漢方薬)

△ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 胃腸の弱い人 (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

してください。3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

【用法・用量】次の量を食前又は食間に、コップ半分以上の水又は白湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	6錠	3回
15歳未満7歳以上	4錠	
7歳未満5歳以上	3錠	
5歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】18錠(3.6g)中

当帰芍薬散エキス(1/2量) 1.650g(シャクヤク2.0g・センキュウ1.5g・タクシャ 2.0g・トウキ 1.5g・ピャクジュツ2.0g・ブクリョウ2.0g) 添加物としてカルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、デキストリン、トウモロコシデンプンを含有します。

◎本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります。効果に変わりはありません。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりと閉めて保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)袋の中に乾燥剤を入れてあります。誤って服用しないよう注意してください。(5)使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。

発売元：ミライズ製薬株式会社

東京都中央区築地6丁目22-4

お問い合わせ先：未来堂

電話 0570-78-3639

受付時間 9:00～18:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元：劑盛堂薬品株式会社

和歌山県和歌山市太田二丁目8番31号

副作用被害救済制度の間合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



PE,金属

製造番号

使用期限