

23



わが家の漢方薬

第2類医薬品

300錠
30日分



✓ 足腰の冷え症

✓ めまい・立ちくらみ

✓ 耳鳴り

当帰芍薬散エキス錠

「とうきしゃくやくさん」



わが家の漢方薬



吸湿しやすいため、開封後は服用のつどチャックをしっかりとしめること



服用に際して、この説明文を必ずお読みください

第2類医薬品

販売名: 当帰芍薬散料錠 T23

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 胃腸の弱い人 (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効能・効果 体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

用法・用量 次^さの量を1日2回食前または食間に、水または白湯にて服用すること

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	5錠	2回
7歳以上15歳未満	4錠	
5歳以上7歳未満	3錠	
5歳未満	服用しないこと	

※食間とは、食後2~3時間を指します
<用法および用量に関連する注意>
1. 用法・用量を厳守すること
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

成分・分量 1日量(10錠)中

当帰芍薬散エキス(1/2量)2200mg(トウキ 1.5g, センキュウ 1.5g, シャクヤク 3.0g, プクリョウ 2.0g, ヒヤクジュツ 2.0g, タクシャ 2.0g より抽出)を含む

添加物として、CMC-Ca, 二酸化ケイ素, クロスCMC-Na, ステアリン酸Mg, タルク, セルロースを含む

保管および取り扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないこと (5) 本剤にぬれた手で触れないこと (6) 手にとった錠剤を元の袋に戻すと、他の錠剤に影響を与えることがあるので注意すること (7) 本剤は天然物を原料としているため、色調、味または香り等が多少異なることがあります。効果に差異はありません (8) 乾燥剤は服用しないこと

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
☎ 0120-149-931

発売元 ティーライフ株式会社

静岡県島田市牛尾118

お問い合わせ先: 0120-09-4970

受付時間: 9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)



SE-1

製造番号

使用期限

製造 中村薬品工業株式会社

販売元 奈良県高市郡高取町大字丹生谷31.32