

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品 漢方製剤

とう き しゃく やく さん
当 帰 芍 薬 散 錠 SH

「当帰芍薬散」は漢方の原典とされる中国の医書『金匱要略』に収載されており、古来より多くの女性に用いられてきた漢方薬です。疲れやすく、冷え症、貧血ぎみの方の足腰の冷えや肩こり・むくみ、更年期障害などに用いられます。

「当帰芍薬散錠SH」は、6種類の生薬から抽出した「当帰芍薬散」エキスを服用しやすい錠剤にしました。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 胃腸の弱い人
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〈効能・効果〉

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：
月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

〈用法・用量〉

次の量を1日3回食前又は食間に、水又は白湯にて服用してください。
(食間とは、食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人(15才以上)	3錠	3回
5才以上15才未満	2錠	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〈裏面もお読みください〉

〈成分・分量〉

成人1日量9錠中に下記の生薬より得た当帰芍薬散エキス(1/2量) 2,200mgを含みます。

トウキ	1.5g	ブクリョウ	2.0g
センキュウ	1.5g	ビャクジュツ	2.0g
シャクヤク	3.0g	タクシャ	2.0g

添加物：クロスカルメロースNa、カルメロースCa、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、結晶セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、タルク、黄色5号、カルナウバロウ

保管及び取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
4. 本剤は湿気を吸いやすいので、服用のつど必ずフタをかたくしめてください。
5. ピンの上部の詰めものは、錠剤が壊れるのを防ぐためにいれてありますので、フタを開けた後は取り除いてください。
6. 本剤にぬれた手で触れないでください。又、手にとった錠剤を元の容器に戻しますと、他の錠剤に影響を与えることがありますのでご注意ください。
7. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■本製品内容についてのお問い合わせ先

おくすり相談室

☎0120-419-111

9時～18時まで(日、祝日を除く)

製造販売元 新日本製薬株式会社
福岡県福岡市博多区吉塚8-7-11

発 売 元 新日本製薬株式会社 本社
福岡県福岡市中央区大手門1-4-7

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 ☎：0120-149-931