

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください

第2類医薬品

漢方製剤



販売名：漢方プレッソ 独活葛根湯

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (5) 発汗傾向の著しい人
- (6) 高齢者
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (8) 次の症状のある人
排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------|
| 皮ふ | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症：四十肩、五十肩、寝ちがえ、肩こり

(裏面につづく)

用法・用量

次の量を食前又は食間に約100mLのお湯を加え、よくかき混ぜて服用してください

| 年齢 | 1回量 | 服用回数 |
|-----------|-----------|------|
| 大人(15才以上) | 1包 | 1日2回 |
| 15才未満 | × 服用しないこと | |

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること
 - (2) 開封前によく振り、開封後はすみやかに溶かして服用すること
 - (3) そのまま服用しないこと
- 本品は1回1包のみきりなので、分割服用しないこと
 - 分包の開封時に薬液が飛び散らないよう注意すること
 - 食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます



成分・分量 1日量(2包:20g)中

独活葛根湯エキス…10.0g

| | | |
|-------------|--------------|------------------|
| カッコン … 2.5g | ケイヒ …… 1.5g | シャクヤク …… 1.5g |
| マオウ …… 1.0g | ドクカツ …… 1.0g | ショウキョウ …… 0.167g |
| ジオウ …… 2.0g | タイソウ … 0.5g | カンゾウ …… 0.5g |
| より抽出 | | |

添加物として、スクラロース、アセスルファムカリウム、エタノール、パラベン、香料を含有する

- 本剤は、天然物(生薬)を用いているため、薬液の色や香り、味が多少異なることがあります
また、溶けにくい場合がありますが、品質に問題ありません

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

10204895