

五十肩 四十肩に

肩用ラックル[®]顆粒

痛みを緩和、肩・腕の動きを回復

第2類医薬品 14包 7日分 1回1包・1日2回服用



五十肩 四十肩に



肩用ラックル[®]顆粒

痛みを緩和
肩・腕の動きを
回復

飲んで効く

14包 7日分
1回1包
1日2回服用

天然生薬100%の漢方薬



第2類医薬品

第2類医薬品

成分・分量 1日量2包5.4g中 独活湯根薬乾燥エキス 4.8g
 トウカクシ...2.0g、ショウヤク...3.0g、カニンゾウ...1.0g、カクコン...5.0g、シオウ...
 4.0g、クテイ...3.0g、クダシラ...2.0g、クダシラ...0.5g、クダシラ...1.0g等、9種の
 生薬から抽出した有効成分4.8gを全て配合した満量処方と称される成分量です。
 添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、Pセセルル、乳糖水和物、ステアリン
 酸マグネシウム、乳糖水和物
 保護及び限以上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。誤用の原因になったり品質が変わることがあります。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
 ご使用に際して、この箱の説明書を必ずお読み下さい。また、必要に応じて要めるよう大切に保管して下さい。



まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けて下さい。

症状	手足のだるさ、しびれ、つばの感やこぼれに似て、脱力感、筋力低下があらわれ、徐々に強くなる。
症状の名称	偽アルドステロン症、ミオパシー

3. 1か月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

副作用	皮膚	消化器	腎臓	心臓
皮膚	かゆみ	食欲不振	腎臓	心臓

2. 服用後、次の症状が出現した場合、服用を中止し、直ちに医師の診察を受けて下さい。この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1)医師の診察を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の弱い人。(4)腎臓が悪い人。(5)腎臓が弱く下痢しやすい人。(6)今までの薬にアレルギーがある人。(7)今までの薬にアレルギーがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

使用上の注意 相対湿度50%以上

第2類医薬品

開け口

14包 7日分
1回1包・1日2回服用
販売名:ラックル顆粒

五十肩 四十肩に肩用ラックル[®]顆粒

天然生薬100%の漢方薬

- 特長
1. 五十肩の痛みを緩和し、肩・腕の動きを回復させる顆粒の飲み薬です。
 2. 五十肩を体の中から改善し、腕を上げられるようになります。
 3. 天然生薬 100%の漢方薬です。
 4. 肩の血流を促進し、ポカポカ暖める作用があります。
 5. 眠くなる成分を配合していません。
 6. 9種の生薬から抽出した有効成分を最大量配合した満量処方です。
 7. 1回1包・1日2回の飲み方です。

用法・用量
 成人(15歳以上) 1回1包を1日2回朝夕、食前又は食間に水かお湯と一緒に服用して下さい。又はお湯に溶かしてから混ぜてから服用して下さい。1か月間毎日飲んで効果がなければ服用を中止して下さい。

15歳未満7歳以上1回2/3包、7歳未満4歳以上1回1/2包、4歳未満2歳以上1回1/3包、いずれも1日2回朝夕、食前又は食間に服用して下さい。

用法・用量に関する注意
 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

効能・効果
 体力中等度又はやや虚弱なものの次の症候：
 五十肩・四十肩・肩こり・寝ちがえ

製薬 日本臓器製薬 大阪府大阪市東淀川区東中津 2-1-1
 大阪府大阪市東淀川区東中津 2-1-1
 大阪府大阪市東淀川区東中津 2-1-1

使用期限
 製造番号
 02280000
 製法販売先
 新生薬品工業株式会社
 奈良県高市郡高取町清水台1289
 副作用報告書請求制度 ☎0120-148-831