

第2類医薬品



漢方煎専科

二朮湯

88

5日分10包



自然のちから、ひとに活かして

株式会社 アキザワ漢方廠

# 漢方薬 二朮湯 「タキザワ」

17D

## △＜使用上の注意＞



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 高齢者
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
  - 次の症状のある人  
むくみ
  - 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合  
は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 【成分・分量】

ビャクジュツ	2.5g	イレイセン	2.5g
ブクリョウ	2.5g	キョウカツ	2.5g
チンピ	2.5g	ハンゲ	4.0g
テンナンショウ	2.5g	ソウジュツ	3.0g
コウブシ	2.5g	カンゾウ	1.0g
オウゴン	2.5g	ショウキョウ	1.0g
1日分（1包14.5g×2）29.0g			

### 【効能・効果】

体力中等度で、肩や上腕などに痛みがあるもの次の諸症：四十肩、五十肩

### 【用法・用量】


1日2回朝夕の空腹時に、本品1包（1回分）を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回量
大人（15歳以上）	全量
15歳未満	服用しないこと

※用法・用量を厳守してください。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）



4 974961 180506



製造販売元  
株式会社 タキザワ漢方薬  
さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1  
お客様相談室 ☎048-688-7923  
受付時間：9時～18時（月～金）

タキザワ漢方

検索

ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先  
（独）医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

☎0120-149-931