

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
又、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤
女神散エキス錠K

 使用上の注意

ⓧ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

ⓧ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人)。
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
(5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(6) 次の医薬品を服用している人。
瀉下薬 (下剤)
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸 (皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
軟便、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力中等度以上で、のぼせとめまいのあるものの次の諸症：
更年期障害、神経症、血の道症、月経不順、産前産後の神経症

〈効能・効果に関連する注意〉

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に、水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人 (15歳以上)	4錠	3回
15歳未満7歳以上	3錠	
7歳未満5歳以上	2錠	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

本品1日量 (12錠) 中
女神散エキス 3200mg (トウキ・センキュウ・ケイヒ・ビャクジュツ・オウゴン・コウブシ・ピンノウジ各1.5g、モッコウ・オウレン各1.0g、ニンジン・カンゾウ各0.75g、ダイオウ0.5g、チョウジ0.25gより抽出)
添加物として、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、タルク、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウを含む。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 本剤にぬれた手で触れないでください。

販売元 **株式会社 協和**
東京都新宿区西新宿1-22-2
協和のび注文・お問い合わせは…
フラコラコールセンター
☎0120-57-2020
受付時間：9:00~21:00 (年中無休)
<http://www.fracora.com>

製造販売元 **中村薬品工業株式会社**
奈良県高市郡高取町丹生谷31.32