

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

ビナキナールHG顆粒

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「金匱要略」に記載されている排膿散に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師、歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	胃部不快感

- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能・効果]

体力中等度以上で、患部が化膿するものの次の諸症：化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの、歯肉炎、扁桃炎

[用法・用量]

下記の量を食間又は空腹時に水又は温湯にて服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回	7才未満4才以上	1/2包	3回
15才未満7才以上	2/3包		4才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 用法・用量を厳守すること。

[成分・分量] [本品1日量3包(1包1.5g)中]

日本薬局方 キ ジ ツ……………2.50g	別紙規格 キ ジ ツ 末……………1.25g
日本薬局方 シャクヤク……………2.50g	日本薬局方 シャクヤク 末……………1.25g
日本薬局方 キ キ ヨ ウ……………1.00g	日本薬局方 キ キ ヨ ウ 末……………0.50g
より製した水製乾燥エキス……………1.19g	日本薬局方 乳 糖……………0.31g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に使用すること。
- 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。



本製品についてのお問合せは下記にお願い申し上げます。
源平製薬株式会社「ご注文・お問合せ窓口」
電 話 0120-108-059
受付時間 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
電 話 0120-149-931



発売元
源平製薬株式会社

〒939-0311 富山県射水市黒河新2643



製造販売元
東洋漢方製薬株式会社

〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号