

タキザワの

漢方煎薬

第2類医薬品

5日分10包  
502

排膿散料「タキザワ」



株式会社  
タキザワ漢方廠

## 漢方薬 排膿散料「タキザワ」

15G

## △&lt;使用上の注意&gt;

## ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。  
生後3ヵ月未満の乳児

## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師、歯科医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	胃部不快感

- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合、服用を中止し、この袋を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【成分・分量】

キ ジ ツ……………3.0g キキョウ……………1.5g  
シャクヤク……………3.0g  
1日分(1包3.75g×2) 7.5g

## 【効能・効果】

体力中等度以上で、患部が化膿するものの次の諸症：  
化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの、歯肉炎、扁桃炎

## 【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらまで煮つめ、和紙袋を除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回量
成人(15歳以上)	全量
15歳未満7歳以上	成人の2/3
7歳未満4歳以上	成人の1/2
4歳未満2歳以上	成人の1/3
2歳未満	成人の1/4

## &lt;用法・用量に関連する注意&gt;

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 100153



製造販売元

株式会社 タキザワ漢方薬

さいたま市見沼区片柳412-1

お客様相談室 ☎048-688-7923

受付時間：9時～18時(月～金)

タキザワ漢方



ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhlgai.html>  
☎0120-149-931