

第2類医薬品

ばくもんとうとう 麦門冬湯

顆粒

満量処方

第2類医薬品

ばくもんとうとう 麦門冬湯

顆粒

満量処方

日本薬局方 麦門冬湯エキス の 1 日最大量
27g の生薬から抽出して得られたエキス
を全量配合した顆粒剤

眠くなる成分は入っていません

体力中等度以下で、たんが切れにくく、
ときに強くせきこみ、又は咽頭の乾燥感
があるものの次の諸症

からぜき、気管支炎、
気管支ぜんそく、
咽頭炎、しわがれ声

第2類医薬品

ばくもんとうとう 麦門冬湯

満量処方

顆粒
42包

眠くなる成分は入っていません

体力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに
強くせきこみ、又は咽頭の乾燥感があるものの
次の諸症

からぜき、気管支炎、気管支ぜんそく、
咽頭炎、しわがれ声

日本薬局方 麦門冬湯エキス の 1 日最大量
27g の生薬から抽出して得られた
エキスを全量配合した顆粒剤

【用法・用量】

1日3回食前又は食間に水かお湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
7歳以上 15歳未満	2/3包	
4歳以上 7歳未満	1/2包	
2歳以上 4歳未満	1/3包	
2歳未満	1/4包	

※食間とは食後2～3時間を指します。

＜用法・用量に関する注意＞

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。
- (3)定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】

成人1日量3包(1包3g)中 日局 麦門冬湯エキス 4.4g

成分	分量	成分	分量
日局 バクモンドウ	10g	日局 タイソウ	3g
日局 ハンゲ	5g	日局 ニンジン	2g
日局 コウベイ	5g	日局 カンソウ	2g

より製した乾燥エキス

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、
ステアリン酸マグネシウム

＜成分・分量に関する注意＞

本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、
顆粒の色調等が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)湿気などにより薬が固化する場合がありますので、
1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】 ☎06-6423-0565

(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

押して開ける

漢方製剤

第2類医薬品

服用前にこの箱の説明書を必ずお読みください。また、添付文書は挿入して
おりませんので、必要なときに読めるよう、この箱を大切に保管してください。

【販売名】 サカンポー麦門冬湯顆粒

【特徴】

- 「麦門冬湯」は、体力が中等度以下で、咽頭に乾燥感がある方から
ぜき、気管支炎、しわがれ声などの症状を改善するための処方です。
- 本剤は「麦門冬湯」の1日最大量の生薬より抽出したエキスを配合し
た満量処方で、飲みやすく服用量を調節しやすい顆粒です。
- 本剤は眠くなる成分を含みませんので、仕事や車の運転にも支障は
ありません。

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は服用しないでください 生後3ヵ月未満の乳児

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人 (5)次の症状のある人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (6)次の診断を受けた人
(3)水様性の痰の多い人 (4)高齢者 高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性あります
ので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登
録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直
ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れが する・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これ らが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加え て、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、 褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位 (からぜきに服用する場合には1週間位) 服用しても症
状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬
剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して
ください

【効能・効果】 体力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに強くせきこ
み、又は咽頭の乾燥感があるものの次の諸症：からぜき、
気管支炎、気管支ぜんそく、咽頭炎、しわがれ声

S1



4 987076 626401



袋：PE、金属



箱

製造番号

使用期限