

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第2類医薬品

47

錠剤 ばくもんとうとう 麦門冬湯

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 水様性の痰の多い人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位（からげきに服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

体力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに強くせきこみ、又は咽頭の乾燥感があるものの次の諸症：
からげき、気管支炎、気管支ぜんそく、咽頭炎、しわがれ声

〔用法・用量〕

食前1時間、又は食間に、温湯で服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人	5～6錠	3回
7～13歳迄	2～3錠	

〈用法・用量に関する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分・分量〕（本品100錠中）

			自社製別紙規格				
日局	カンゾウ末	1.88 g	日局	バクモンドウ	10.0 g	} (麦門冬湯エキス) 別紙規格水製エキス 3.0g	
別紙規格	バクモンドウ末	9.08 g	日局	ハンゲ	5.0 g		
別紙規格	ハンゲ末	4.58 g	日局	タイソウ	3.0 g		
日局	ニンジン末	1.88 g	日局	ニンジン	3.0 g		
別紙規格	コウバイ末	4.58 g	日局	カンゾウ	3.0 g		
			日局	コウバイ	5.0 g		

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管すること。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。
- (4)保存の状況が悪いと、場合によっては虫、カビ等がつくことが考えられますので、上記の注意を必ず守って下さい。

本剤は、原料として天然の生薬を用いていますので、製品により多少色が異なったり、開栓後、吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。

〔お問い合わせ先〕

一元製薬株式会社「お客様相談室」
〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10
電話：03-3973-2917
○受付時間：9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931



一元製薬株式会社

東京都豊島区要町3-4-10