

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの 麦門冬湯

バクモンドウトウ

ウチダの麦門冬湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異なおいがあります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 水様性の痰の多い人。
  - 高齢者
  - 次の症状のある人。  
むくみ
  - 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等が見られ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位（からげきに服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力衰えて皮膚乾燥し、のぼせて咽喉に異物感、乾燥感、刺戟感などがあり、下からこみあげてくるような強い咳嗽<sup>注1)</sup>をし顔面紅潮するもので、通常喀痰<sup>注2)</sup>は少量でねばく喀出困難なもの。

気管支炎、気管支喘息、咽喉炎、胸部疾患の咳嗽、百日咳、妊娠咳、しゃっくり。

注1) 「咳嗽」とは痰のある咳を指します。

注2) 「喀痰」とは吐いた痰を指します。

用法・用量

年齢	1日量
大人（15歳以上）	1袋（1日分）につき水600mL（約3合3勺）を加え、あまり強くない火にかけ300mL（約1合7勺）に煮つめ、袋をとり出し、2～3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

成分・分量

本品1袋中

バクモンドウ	10.0g	タイソウ	3.0g
ハンゲ	5.0g	ニンジン	2.0g
コウベイ	5.0g	カンゾウ	2.0g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

\*新潟県上越市大潟区蜘蛛池 1755-3