

この説明書は、服用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

漢方薬

第2類医薬品

# 三宝(味地黄丸)

本剤は有効成分の粉末を蜂蜜でよく練り、丸剤としたもので、服用しやすくなっています。

次のような症状を主な目標として使われます。

- ◎ 疲労倦怠感があり、特に下半身の疲労脱力感がある。
- ◎ 手足の冷えがある。
- ◎ 多尿、頻尿で夜間トイレへ行く回数が多い。(例えば3回以上)  
逆に尿量が少なくなったり、尿の出が悪い。
- ◎ 口渇がある。

このような症状があって、排尿困難・頻尿・軽い尿漏れ・残尿感・夜間尿・高齢者のかすみ目・下肢痛・腰痛・かゆみ・むくみ等のある方に効果があります。これらの症状は、中年期以後の人に多く見られます。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
次の人**は服用しないでください**

(1) 胃腸の弱い人。(2) 下痢しやすい人。



### 相談すること

1. 次の人**は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
そ の 他	動悸、のぼせ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## ■ 効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渴があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ

## ■ 用法・用量

1日3回、次の量を食間に水か湯で服用してください。

年 齢	1回量
大 人（15才以上）	25粒

（計量用スプーンが添付してあります。）

## ■ 成 分


1日量（75粒）中に次の成分を含んでいます。

成 分	含 量
ジオウ（地黄）	1.500g
サンシュユ（山茱萸）	0.750g
サンヤク（山薬）	0.750g
タクシャ（沢瀉）	0.750g
プクリョウ（茯苓）	0.750g
ポタンピ（牡丹皮）	0.750g
ケイヒ（桂皮）	0.250g
加工ブシ末（加工附子末）	0.125g
ハチミツ（蜂蜜）	1.135g

添加物としてハチミツ、寒梅粉、タルクを含んでいます。

## ■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。



## ■ お問い合わせ先

本剤の服用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話03-3952-0100  
月～金曜日 9：00～17：00（祝祭日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



製造販売元  
**三宝製薬株式会社**  
東京都新宿区下落合2-3-18