



----- ✂ ここからお切りください。 -----

漢方製剤 販売名：八味丸 開封後はチャックをしっかり閉じて保管してください。 服用前にこの説明文書を必ずお読みください。 第2類医薬品

ⓧ

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は服用しないでください
(1)胃腸の弱い人。(2)下痢しやすい人。

🗨️

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
(4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢

4. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】
体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿ときに口渴があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ

【用法・用量】

次の量を、食前又は食間に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15才以上)	12 丸	3 回
7才以上 15才未満	8 丸	
7才未満	服用させないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉
(1)用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】 36丸(成人1日量)中
ジオウ末 1000mg、サンシュユ末 580mg、サンヤグ末 580mg、タクシャ末 580mg、
フクリョウ末 580mg、ボタンビ末 580mg、ケイヒ末 330mg、ブシ末 100mg
添加物としてトウモロコシデンプン、デヒドロ酢酸Na、寒梅粉、ハチミツ、マクロゴール、ナタネ油、タルク含有します。

【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4)湿気により丸剤の外観が変化する場合があるので、ぬれた手で触れないでください。
ぬれた手で触れた丸剤は元の袋に戻さないでください。
(5)使用期限を過ぎたものは服用しないでください。

副作用被害救済制度 0120-149-931

使用期限

発 売 元 三洋薬品HBC株式会社

製造番号

東京都豊島区西池袋 2-39-6

池袋ツルミビル

☎0120-86-3434

製造販売元 第一薬品工業株式会社

くすり相談窓口：電話 076-435-5055

富山県富山市草島 15-1

午前9時から午後4時30分まで

(土、日、祝日を除く)