

この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

漢方製剤

第2類医薬品

やくしはちみじおうまつ

薬師八味地黄末

本剤は原典 金匱要略に収載の“八味地黄丸”であり、原典に倣って生薬末で製造したこだわりの製剤です。

本剤は、腎虚に対する補益剤ですので、下半身が冷えて弱くなった方、残尿感や頻尿など尿のことで心配のある方に適しています。

⚠️ • 使用上の注意 •

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

- (1) 生後3ヵ月未満の乳児
- (2) 胃腸の弱い人
- (3) 下痢しやすい人



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

健康、そして幸せな明日へ。



日本薬師堂

NIHON YAKUSHIDO

(裏面につづく)

●効能・効果●

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渇があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ

●用法・用量●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。

(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1 包	3 回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

●成分・分量●

本品3包(6.3g)中

ジオウ	1.77g	ブクリョウ	0.67g
サンシュユ	0.89g	ポタンピ	0.67g
サンヤク	0.89g	ケイヒ	0.22g
タクシャ	0.67g	ブシ末	0.22g

添加物：軽質無水ケイ酸、トウモロコシデンプン

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

〔お問い合わせ〕

株式会社日本薬師堂

☎0120-894-894 (フリーダイヤル)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/index.html>

☎0120-149-931 (フリーダイヤル)

発 売 元
株式会社日本薬師堂
東京都目黒区青葉台 3-2-12



製造販売元
松浦薬業株式会社
名古屋市中区円上町24-21