

✂ここからお切りください。

開封後はチャックを  
しっかり閉めて保管  
してください。

第2類医薬品



270錠入

軽い尿漏れ  
頻尿・残尿感



てんらい黄耆王皇

尿のお悩み  
《夜間尿》《排尿困難》

✂ここからお切りください。

使用前にこの袋の説明書を必ずお読みください

開封後はチャックをしっかり閉めて保管してください  
販売名：てんらい黄耆王皇

漢方製剤 八味地黄丸 第2類医薬品

270錠30日分 ※成人(15歳以上)の場合

⚠使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
  - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渇があるものの次の諸症：下腹痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ

【用法・用量】 右の量を1日3回食前又は食間※に水又は白湯にて服用する。※食間とは、食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後のことである。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	3回
5歳以上15歳未満	2錠	
5歳未満	服用しない	

〈用法・用量に関連する注意〉

5歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】 本品は灰褐色～褐色のフィルムコーティング錠で、1日量(9錠)中に八味地黄丸エキス(1/2量)2200mg(ジオウ2.5g、サンシュユ・サンヤク・タクシャ・ブクリョウ・ポタンビ各1.5g、ケイヒ・プシ末各0.5gより抽出)を含有する。

添加物：CMC-Ca、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、タルク、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナバロウ

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) ぬれた手で取り扱わないこと。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて変色などが生じることがある。また、ぬれた錠剤を袋に戻すと他の錠剤にも影響を与えるため戻さないこと。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先 お客様相談室  
☎0120-53-3451 平日9:00～17:00



4 954007 024179

【製造販売元】

明治薬品株式会社  
富山県富山市三郷6番地



MA-1 製造番号  
使用期限