

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。（裏面もお読み下さい。）また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

## ◆ウチダの漢方製剤◆

## 和漢八味丸

ワカンハチミガン

和漢八味丸は漢方処方にしたがって、生薬を配合し粉末化して丸剤としたものです。



## 使用上の注意



## してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渴があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ

## 用法・用量

次の1回量を1日3回、食前または食間に服用する。

年齢	1回量
成人（15歳以上）	20丸
15歳未満 7歳以上	13丸
7歳未満 4歳以上	10丸
4歳未満 3歳以上	6丸
3歳未満	服用しないこと

## 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意すること。

【丸剤】

第2類医薬品

# 和漢八味丸

ワカンハチミガン

## 成分・分量

本品 60 丸(1日分) 中	
ジオウ	1.5480 g
サンシュユ	0.7740 g
サンヤク	0.7740 g
タクシャ	0.5805 g
ブクリョウ	0.5805 g
ボタンビ	0.5805 g
ケイヒ	0.1935 g
ブシ 2	0.097 g

添加物として、ハチミツを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

## ●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

T E L 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります、効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

新潟県上越市大潟区蜘蛛池 1755-3