



製品破損防止の詰め物は  
服用時に捨ててください

開封口

漢方薬 270錠

この説明文書は、お薬とともに保管し、  
服用の際には、必ずお読みください。

販売名: カツジン®EP錠 **第2類医薬品**

【成分・分量】 18錠(5.4g)中  
(ケイヒ0.36g・サンシュユ1.08g・サンヤク  
1.08g・ジオウ1.8g・タクシャ1.08g・ブクリョウ  
1.08g・ボタンビ1.08g・ブシ末0.36g) 八味地  
黄丸エキス(9/25量) 2.2g、ケイヒ末0.065g、  
サンシュユ末0.196g、サンヤク末0.196g、ジオ  
ウ末0.327g、タクシャ末0.196g、ブクリョウ末  
0.196g、ブシ末0.065g、ボタンビ末0.196g  
添加物として軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネ  
シウム、乳糖、バレイシヨデンブ、ヒドロキシブ  
ロピルセルロースを含有します。

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少  
色調の異なることがあります。効果に変わりは  
ありません。

【用法・用量】 次の量を食前又は食間に、コップ  
半分以上のぬるま湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	6錠	3回
15歳未満 7歳以上	4錠	
7歳未満 5歳以上	3錠	
5歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監  
督のもとに服用させてください。

△ 使用上の注意

- してはいけないこと**  
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作  
用が起こりやすくなります)  
次の人は服用しないでください。

(1) 胃腸の弱い人 (2) 下痢しやすい人

**相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販  
売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又  
は妊娠していると思われる人 (3) のぼせが強  
く赤ら顔で体力の充実している人 (4) 今まで  
に薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こし  
たことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作  
用の可能性があるため、直ちに服用を中止  
し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録  
販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

- 服用後、次の症状があらわれることがあ  
るので、このような症状の持続又は増強が見  
られた場合には、服用を中止し、この文書  
を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談  
してください。 下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場  
合は服用を中止し、この文書を持って医師、  
薬剤師又は登録販売者に相談してください。

+

頻尿、残尿感、夜間尿に  
八味地黄丸

For frequent urination,  
residual urine, nocturia  
270 tablets

カツジンEP錠



第2類医薬品

体力中等度以下で、  
疲れやすくて、四肢が冷えやすく、  
尿量減少又は多尿の方

【効能・効果】

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えや  
すく、尿量減少又は多尿で、ときに口渇があるも  
のの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者の  
かすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻  
尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こ  
り、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい  
所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用  
の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでくださ  
い。



詳しい製品情報・  
薬剤師のアフターサポート  
minacolorでは、お薬について  
薬剤師に相談できます。

製造番号

使用期限

販売元 ミナカラ薬局

お客様相談窓口 ☎03-5544-8440  
受付時間: 10:00~16:00(平日・月-金)

製造販売元 劑盛堂薬品株式会社  
和歌山市太田二丁目8番31号

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



4 987474 773219

1

