

この添付文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

## 【漢方薬】

# 八味地黄丸 ユリジェッツ錠

第2類医薬品

販売名：ユリジェッツ錠

- ◆ ユリジェッツ錠は「八味地黄丸」という処方をもとにした漢方薬です。
- ◆ 体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿がある人の、排尿困難や夜間尿、軽い尿漏れなどに効果があります。

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
  - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渇<sup>a)</sup>があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状<sup>b)</sup>の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ

a) 口渇：口のかわきのことを示します。

b) 高血圧に伴う随伴症状：高血圧に伴って起こる症状のことを示します。

## 用法・用量

次の量を食前又は食間<sup>注)</sup>に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

注)「食間」とは食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	6 錠	3 回
15歳未満 7 歳以上	4 錠	
7 歳未満 5 歳以上	3 錠	
5 歳未満	服用しないでください	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(裏面へ)

## 成分・分量

本剤18錠(5.4g)中

ケイヒ	0.36g	} 八味地黄丸エキス(9/25量).....2.2g
サンシュユ	1.08g	
サンヤク	1.08g	
ジオウ	1.8g	
タクシャ	1.08g	
ブクリョウ	1.08g	
ポタンピ	1.08g	
ブシ末	0.36g	

ケイヒ末	0.065g
サンシュユ末	0.196g
サンヤク末	0.196g
ジオウ末	0.327g
タクシャ末	0.196g
ブクリョウ末	0.196g
ブシ末	0.065g
ポタンピ末	0.196g

添加物として軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、乳糖、バレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります、効果に変わりはありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

### お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、下記をお願いします。

剤盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00  
(土、日、祝日を除く)

製造販売元

**剤盛堂薬品株式会社**

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号