

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

【漢方薬】

## 八味地黄丸Z錠

第2類医薬品

168錠

### ⚠ 使用上の注意

**⊗ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないでください。

- (1) 胃腸の弱い人
- (2) 下痢しやすい人



### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
  - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 【用法・用量】

次の量を食前又は食間に、コップ半分以上の水又は白湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	4錠	3回
15歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守してください。

【効能・効果】 体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渇があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ

【成分・分量】 12錠(3.6g)中  
(ケイヒ0.5g・サンシュユ1.5g・サンヤク1.5g・ジオウ2.5g・タクシャ1.5g・ブクリョウ1.5g・プシ末0.5g・ボタンピ1.5g)八味地黄丸エキス(1/2量)2.2g

添加物としてカルメロースカルシウム、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりと閉めて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 袋の中に乾燥剤を入れてあります。誤って服用しないよう注意してください。
- (5) 使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。

【発売元】 株式会社MORI PHARMACY  
東京都豊島区北大塚3-25-16伊納ビル2F  
問合せ先：090-7519-2946  
(平日10時～19時)

【製造販売元】 劑盛堂薬品株式会社  
和歌山市太田二丁目8番31号

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931