

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

漢方薬

八味地黄丸「オオクサ」

八味地黄丸(分包)「オオクサ」

特 徴

- 漢方薬「八味地黄丸」(はちみじおうがん)は、中高年の方の体力の衰えや、老化による腰痛、残尿感、夜間頻尿、軽い尿漏れなどによく効きます。
- 八味地黄丸「オオクサ」及び八味地黄丸(分包)「オオクサ」は、8種類の生薬末をハチミツで練り合わせた丸剤で、独特な香味を持ち、大変のみやすくなっています。
- 高血圧に伴う肩こり、頭重、耳鳴りにも適しています。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は服用しないでください

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-----------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 食欲不振、胃部不快感、腹痛 |
| そ の 他 | 動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渇があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ



足腰のしびれ



かすみ目



排尿困難

用法・用量

次の量を食前又は食間に、水またはお湯でかまずに服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 成人(15歳以上) | 20丸(1包) | 3回 |
| 7歳以上15歳未満 | 14丸(約2/3包) | |
| 7歳未満 | 服用しないでください | |

<用法・用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量


成人の1日服用量60丸(3包)中

| 成分 | 含量 |
|------------|---------|
| ジオウ(地黄) | 1600 mg |
| サンシュユ(山茱萸) | 800 mg |
| サンヤク(山薬) | 800 mg |
| タクシャ(沢瀉) | 600 mg |
| ブクリョウ(茯苓) | 600 mg |
| ポタンピ(牡丹皮) | 600 mg |
| ケイヒ(桂皮) | 200 mg |
| ブシ末(附子末) | 200 mg |

添加物として寒梅粉、ハチミツ、セラックを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、分包の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。



包装 1500丸 500g

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

大草薬品株式会社 「お客様相談係」

電話: 046-834-1193 [月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)]

発売元

大草薬品販売株式会社

神奈川県横須賀市森崎1-17-15

製造販売元

大草薬品株式会社

神奈川県横須賀市森崎1-17-15