

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また必要などきに読めるように大切に保管しておいてください。

第2類医薬品

ハチミジオウ錠

(八味地黄錠)

製品の特徴

本剤は、茶褐色の素錠で、特有のにおいと味があります。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。

👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|---------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感、腹痛 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1ヶ月くらい服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

効能・効果

下腹部軟弱、腰に冷感あり、尿利減少または頻数で全身または手足に熱感あるもの。
腎炎、糖尿病、腰神経痛、水腫、膀胱カタル

注)「膀胱カタル」とは、膀胱炎のことです。

用法・用量

大人は1回に8錠ずつ、1日3回食前または食間に、水または白湯にて服用してください。
小児用量は、

15歳以下8歳まで 1回4錠 4歳以下2歳まで 1回2錠
7歳以下5歳まで 1回3錠

また服用に際して、次のことに注意してください。

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

成分・分量

本剤は大人1日の服用量24錠中に次の成分を含んでいます。

| | | | |
|---------|------|---------|------|
| 日局サンヤク | 0.8g | 日局ブクリョウ | 0.4g |
| 日局サンシュユ | 0.6g | 日局ボタンピ | 0.4g |
| 日局タクシャ | 0.4g | 日局ケイヒ | 0.2g |

日局ジオウ 6g、日局サンヤク 1.3g、日局サンシュユ 1.3g、日局タクシャ 1.0g、日局ブクリョウ 1.0g、日局ボタンピ 1.0g、日局ケイヒ 0.3gの水溶性乾燥エキス 2.0g

保管および取り扱い上の注意

- (1)お子さまの手のとどかない所に保管してください。
- (2)品質を保つため、直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。
- (3)誤った用い方をさけ、品質を保つために、他の容器に入れかえないでください。

その他

- 本剤は生薬（薬用の草根木皮など）を原料とした薬ですので、製品により、錠剤の色調などが多少異なることがあります。効能・効果にかわりありません。
- 長い間保存していて、再び服用される場合は、薬が湿っていないか、不快なおいがないか、虫害がないかなどをよく確かめてから、服用してください。

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

長倉製薬株式会社 ☎06-6652-5000

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元



長倉製薬株式会社

大阪市西成区聖天下 1-7-16

長倉の漢方薬