

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください

漢方製剤 八味地黄丸

第2類医薬品

モレスト漢方錠

製品の特徴

8種の生薬から抽出した漢方薬「八味地黄丸（はちみじおうがん）」が
排尿トラブルを改善します

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと

- (1) 胃腸の弱い人
(2) 下痢しやすい人



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
そ の 他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渇があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に、水又は白湯にて服用すること

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	3回
5歳以上15歳未満	2錠	
5歳未満	服用しないこと	

※食間とは、食後2～3時間を指します

<用法および用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守すること
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

成分・分量 1日量（9錠）中

成人1日量9錠中には下記の生薬から抽出した八味地黄丸エキス（1/2量）2200mgを含む

ジオウ……………2.5g	サンシュユ……………1.5g	サンヤク……………1.5g
タクシャ……………1.5g	フクリョウ……………1.5g	ボタンビ……………1.5g
ケイヒ……………0.5g	ブシ末……………0.5g	

添加物として、CMC-Ca、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、タルク、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウを含む

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- 小児の手の届かない所に保管すること
- 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）
- 使用期限の過ぎた製品は服用しないこと
- 本剤にぬれた手で触れないこと
- 手にとった錠剤を元の容器に戻すと、他の錠剤に影響を与えることがあるので注意すること
- 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等が多少異なることがありますが、効果に差異はありません

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

お問い合わせ先

株式会社 ドクターシーラボ 医薬品相談窓口
☎ 0120-888-647 受付時間10:00～17:00（土・日・祝日を除く）

発 売 元 株式会社 ドクターシーラボ
埼玉県川口市西立野大宝68-2

製造販売元 中村薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町大字丹生谷31.32