

この添付文書は、本剤をご服用になる前に、かならずお読みください。
また、ご服用になる間は、いつでも読めるよう保管しておいてください。

漢方薬

ハチ ミ ジ オウ ガン 八味地黄丸

第2類医薬品

販売名 **フジワ八味丸** (ハチミガン)

八味地黄丸は、別名「腎気丸」とも呼ばれ、「金匱要略」という漢方の古典書をもとに、8種類の生薬末を合わせ、結合剤（ハチミツ）を加えて、飲みやすい丸薬としたものです。



使用上の注意

してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）
次の人は服用しないでください。

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〈効能・効果〉

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渇があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ

〈用法・用量〉

次の1回量を1日3回、白湯又は常水にて通常食間に服用してください。

食間とは・・・食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量
大 人（15歳以上）	20 丸
15歳未満	服用しないこと

〈成分・分量〉1日量（60丸中）

成 分	60丸中
タクシャ末	0.67g
ブクリョウ末	0.67g
ポタンピ末	0.67g
ケイヒ末	0.22g
ジオウ末	1.77g
サンシュユ末	0.89g
サンヤク末	0.89g
加工ブシ末	0.22g

添加物としてハチミツ、セラックを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- （1） 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- （2） 小児の手の届かない所に保管してください。
- （3） 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）

お問い合わせ先

三井薬品株式会社 お客様相談窓口 電話：03-5809-2790
受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

発 売 元 **三井薬品株式会社**
東京都千代田区岩本町2-10-2 神田ウサミビル8階

製造販売元 **二反田薬品工業株式会社**
広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号