

第2類医薬品

漢方煎専科

八味地黄丸料

7

5日分15包



自然のちから、ひとりに活かして
株式会社 アキザワ漢方廠

(*) : 2016年10月 改訂

第2類医薬品

漢方薬 八味地黄丸料「タキザワ」

19B

⚠<使用上の注意>

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。

- (1) 胃腸の弱い人
- (2) 下痢しやすい人



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤・かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ(*)

3. 服用後、次の症状があわられることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】	
ジ オ ウ	5.0 g
ブクリヨウ	3.0 g
サンシュユ	3.0 g
ボタンビ	3.0 g
サン ャク	3.0 g
ケイヒ	1.0 g
タクシヤ	3.0 g
ブシ	0.5 g
1日分 (1包7.17g×3)	21.5 g

【効能・効果】

体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渴があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ

【用法・用量】

1日3回朝夕の空腹時に、本品1包（1回分）を和紙袋入りのまま、水約200mLを加えて半量ぐらいで煎じめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回量
成人(15歳以上)	全量
15歳未満 7歳以上	成人の2/3
7歳未満 4歳以上	成人の1/2
4歳未満	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 180421



製造販売元
株式会社タキザワ漢方廠
さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1
お客様相談室 048-688-7923
受付時間：9時～18時(月～金) ホームページ:takizawa.asia

タキザワ漢方

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
0120-149-931

