



服用に際して、外箱の説明文を必ず  
お読みください。又、必要な時に読  
めるよう大切に保管してください。

開封口

奈良県は、古来からのくすりの原料である生薬と深い関わりをもっており、大和を中心として薬用植物が栽培されたほか、諸外国から渡來の生薬も、大和に集まりました。「大和壳葉」として確立し、医薬品が重要な産業となっています。

#### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になります)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- ビンの中の詰め物は錠剤の破損防止のためです。服用時に捨ててください。

お問い合わせ先 株式会社奈良大和生薬

医薬品相談窓口 ☎ 0120-005-189  
受付時間 9:00~18:00(年中無休)

発 売 元 株式会社奈良大和生薬  
奈良県奈良市二条大路南1-2-11

製造販売元 OJAS PHARMA株式会社  
奈良県五條市住川町1321  
副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



販売者

使用期限

販売名 第2類医薬品

**奈良八味地黄丸錠SP**

内容量: 248錠(1日8錠 31日分)

#### ⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと  
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人服用しないこと。

(1)胃腸の弱い人。(2)下痢しやすい人。

☒ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- 医師の治療を受けている人。
  - 妊娠又は妊娠していると思われる人。
  - のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤・かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしづれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

漢方  
**兆**  
きさくシケイ

第2類医薬品

**頻尿**  
夜間の  
尿漏れが気になる  
八味地黄丸エキス2200mg配合

残尿感・排尿困難

**奈良八味  
地黄丸錠  
SP**

1日8錠 31日分 248錠

**奈良大和生薬**

開封年月日

成分・分量 1日量:8錠中(1回4錠1日2回)

●八味地黄丸エキス(1/2量)…2200mg  
ジオウ2.5g、サンシユウ・サンヤク・タクシャ・ブクリョウ・ボタンビ各1.5g、ケイヒ・ブシ末各0.5gより抽出。

添加物として、カルメロースナトリウム、含水二酸化ケイ素、ラウリル硫酸ナトリウム、タルク、ステアリン酸マグネシウム、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ヒプロメロース、マクロゴール6000、カラメル、黒酸化鉄、三二酸化鉄、酸化チタン、カルナバワックスを含む

#### 功能・効果

体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渴があるものの次の諸症:下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ

#### 用法・用量

次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	4錠	2回
15歳未満7歳以上	3錠	
7歳未満5歳以上	2錠	
5歳未満	服用しないこと	

#### 【用法・用量に関する注意】

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。