

漢方薬

はんげこうぼくとう

半夏厚朴湯エキス錠〔大峰〕



【使用上の注意】



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位(つわりに服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【成分・分量】本品1日量(12錠)中

「日局」ハ ン ゲ	3.0g
「日局」ブ ク リ ョ ウ	2.5g
「日局」コ ウ ボ ク	1.5g
「日局」シ ョ ウ キ ョ ウ	0.5g
「日局」ソ ヨ ウ	1.0g

上記生薬より得た半夏厚朴湯エキス(1/2量)1400mgを含みます。

なお、添加物としてステアリン酸Mg、カルメロースCa、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、水酸化アルミナマグネシウム、乳糖を含みます。

- 【効能・効果】 体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：
不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、のどのつかえ感

- 【用法・用量】 次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。
(食間とは、食後2~3時間を指します。)

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	4 錠	3回
15歳未満7歳以上	3 錠	
7歳未満5歳以上	2 錠	
5歳未満	服用しないで下さい	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出る場合がありますが、効果には変わりありませんので安心して服用して下さい。

- 【お問い合わせ先】 伸和製薬株式会社 情報管理室
〒116-0003 東京都荒川区南千住5丁目17番8号
電 話：03 (3807) 3780
受付時間：9時から17時まで(土・日曜、祝日を除く)

発 売 元 伸 和 製 薬 株 式 有 限 公 司
東京都荒川区南千住5丁目17番8号

製 造 販 売 元 大 峰 堂 薬 品 工 業 株 式 有 限 公 司
奈良県大和高田市根成柿574番地

