

第2類医薬品



漢方煎専科

半夏白朮天麻湯

37

5日分10包



自然のちから、ひとに活かして
株式会社 アキザワ漢方廠

2015年4月(記載要領変更に伴う改訂)

第2類医薬品

漢方薬 半夏白朮天麻湯「タキザワ」

16G

△<使用上の注意>



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。

生後3ヶ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 今までに薬などにより発疹・発赤・かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】	
ハ ン グ	3.0g オ ウ キ 1.5g
ビ ャ ク ジ ュ ツ	3.0g ニ ナ ジ ナ 1.5g
チ ン ピ	3.0g タ ク シ ャ 1.5g
ブ ク リ ョ ウ	3.0g オ ウ バ ク 1.0g
バ ク ガ	2.0g シ ョ ウ キ ヨ ウ 1.5g
テ ナ マ	2.0g
1日分 (1包11.5g×2) 23.0g	

【効能・効果】

体力中等度以下で、胃腸が弱く下肢が冷えるものの次の諸症：頭痛、頭重、立ちくらみ、めまい、蓄膿症(副鼻腔炎)

【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回量
大人(15歳以上)	全量
15歳未満7歳以上	大人の2/3
7歳未満4歳以上	大人の1/2
4歳未満2歳以上	大人の1/3
2歳未満	大人の1/4

【用法・用量に関する注意】

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 180216



製造販売元
株式会社タキザワ漢方廠
さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1
お客様相談室☎048-688-7923
受付時間:9時~18時(月~金)

タキザワ漢方

検索

ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

☎ 0120-149-931