

第2類医薬品



漢方煎専科

# 茯苓飲

69

5日分10包



自然のちから、ひとに活かして  
株式会社 アキザワ漢方廠

## 漢方薬 茯苓飲 「タキザワ」

17G

## ⚠️&lt;使用上の注意&gt;

## ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



## ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ありますので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位(胃炎、胸やけに服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【成分・分量】

ブクリョウ……………5.0g ショウキョウ……………1.0g  
 ソウジュツ……………4.0g チ ン ピ……………3.0g  
 ニンジン……………3.0g キ ジ ツ……………1.5g  
 1日分(1包8.75g×2) 17.5g

## 【効能・効果】

体力中等度以下で、はきげや胸やけ、上腹部膨満感があり尿量減少するものの次の諸症：胃炎、神経性胃炎、胃腸虚弱、胸やけ

## 【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回量
大人(15歳以上)	全量
15歳未満7歳以上	大人の2/3
7歳未満4歳以上	大人の1/2
4歳未満2歳以上	大人の1/3
2歳未満	大人の1/4以下

## &lt;用法・用量に関連する注意&gt;

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 180179



製造販売元  
 株式会社 タキザワ漢方薬  
 さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1  
 お客様相談室 ☎048-688-7923  
 受付時間：9時～18時(月～金)

タキザワ漢方



ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先  
 (独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\_camp/index.html

☎0120-149-931