

第 2 類  
医薬品

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保存してください。

漢方薬

ぼう い おう ぎ とう

防已黄耆湯エキス錠〔大峰〕



【使用上の注意】



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状        |
|------|------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ  |
| 消化器  | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】 本品1日量(12錠)中

「日局」ボ ウ イ ……2.5g 「日局」タ イ ソ ウ ……1.5g

「日局」オ ウ ギ ……2.5g 「日局」カ ン ゾ ウ ……0.75g

「日局」ジャクジュツ ……1.5g 「日局」ショウキョウ …… 0.5g

上記生薬より得た防已黄耆湯エキス(1/2量)1300mgを含む。

なお、添加物としてステアリン酸Mg、カルメロースCa、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、水酸化アルミナマグネシウム、乳糖を含む。

【効能・効果】 体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症：

肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)

【用法・用量】 次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。  
(食間とは、食後2～3時間を指します。)

| 年 齢       | 1回量        | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 成人（15歳以上） | 4 錠        | 3回     |
| 15歳未満7歳以上 | 3 錠        |        |
| 7歳未満5歳以上  | 2 錠        |        |
| 5歳未満      | 服用しないでください |        |

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出ることがありますが、効果には変わりありませんので安心して服用してください。

\*【お問い合わせ先】

伸和製薬株式会社 情報管理室  
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町二丁目15番15号  
電 話：0120-019-776  
受付時間：9時から17時まで(土・日曜、祝日を除く)

\*発 売 元

伸 和 製 薬 株 式 有 限 公 司  
東京都中央区日本橋人形町二丁目15番15号



製造販売元

大峰堂薬品工業株式会社  
奈良県大和高田市根成柿574番地