

開封口

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
- (4) ビンの中の詰め物は、開封後に捨ててください。(詰め物は、錠剤が輸送中に破損するのを防止するためのものです)
- (5) ビンの中の包装紙に包まれた平型錠は、乾燥剤です。服用しないでください。
- (6) 水分が錠剤につきまると、変色など品質に影響を与える場合がありますので、ぬれた手で触れないでください。
- (7) 吸湿しやすいため、服用の都度ビンのカップをしっかりと開めてください。
- (8) 使用期限(外箱・ラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先 株式会社富山常備薬グループ
医薬品相談窓口
☎0120-137-093
受付時間 9:00~18:00(年中無休)

発売元 株式会社富山常備薬グループ
富山県富山市丸の内1丁目8番17号

製造販売元 寧薬化学工業株式会社
奈良県大和高田市旭南町2番25号



ビンの中の詰め物は錠剤の破損防止のためです。開封後に捨ててください。

服用前に、この説明書をよくお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。むくみ
 - (6) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起ることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる。空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこぼばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

AS4186200817

第2類医薬品

漢方

とやまぼういおうぎとうじょう

富山防已
黄耆湯錠

富山常備薬グループ

第2類医薬品

ひ まん

肥満に伴う
関節腫れ
の痛み
飲んで効く医薬品

漢方

31日分 372錠

とやまぼういおうぎとうじょう
富山防已
黄耆湯錠

防已黄耆湯乾燥エキス2025mg配合

ポウイ・オウギ・ビャクジュツ
ショウキョウ・タイソウ・カンゾウ

富山常備薬グループ

使用期限

製造番号



開封年月日

開封時に記入してください。

第2類医薬品

販売名:

富山防已黄耆湯錠

成分・分量 1日量:12錠 3000mg中

●防已黄耆湯乾燥エキス(「漢方入門講座」、1/2量)
…2025mg

ポウイ2.0g、オウギ2.5g、ビャクジュツ1.5g、ショウキョウ0.5g、タイソウ2.0g、カンゾウ1.0gより抽出。
添加物として乳糖水和物、セルロース、ケイ酸アルミニウム、ステアリン酸マグネシウム、カルメルローズカルシウム、マクロゴールを含有する。

【成分に関連する注意】

本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症:
肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)

用法・用量

次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人15歳以上	4錠	3回
15歳未満	服用しないでください	

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 食間とは食後2~3時間を指します。