

しぼりだしシリーズ

第2類医薬品

ベラミスW

Beramis

やわらか太りの方に

ポウイ
オウギ
ビャクジュツ

ショウキョウ
タイソウ
カンゾウ

ぼう い おう ぎ とう
防 己 黄 耆 湯

180錠 15日分

タブレット
(実寸サイズ)

体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向がある肥満症の方に

✂ ここからハサミでお切りください。

開封後は、湿らないようにチャックを合わせて端からしっかり押さえてください。

第2類医薬品

漢方製剤
180錠(15日分)

しぼりだしシリーズ

【販売名】ベラミスW

【効能・効果】

体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症：肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)

【成分・分量】1日量：12錠 3,000mg中

防己黄耆湯乾燥エキス
(「漢方入門講座」1/2量)→2,025mg
ポウイ2.0g、オウギ2.5g、ビャクジュツ1.5g、ショウキョウ0.5g、タイソウ2.0g、カンゾウ1.0gより抽出。
添加物として乳糖水和物、セルロース、ケイ酸A1、ステアリン酸Mg、カルメロースCa、マクロゴールを含有する。

【成分に関連する注意】

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

【用法・用量】

次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人15歳以上	4錠	3回
15歳未満	服用しないでください	

【用法・用量に関連する注意】

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)食間とは食後2～3時間を指します。

【保管及び取り扱い上の注意】

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックを閉じて保管してください。2.小児の手の届かない所に保管してください。3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 4.水分が錠剤につきますと、変色など品質に影響を与える場合がありますので、ぬれた手で触れないでください。5.吸湿しやすいため、服用の都度チャックをしっかりと閉じてください。
- 6.使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 7.袋の中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。

【お問い合わせ先】

株式会社ソシア お客様サービスセンター
TEL：0299-806-806
(受付時間 10:00～18:00/年中無休)

【発売元】

株式会社ソシア モデルラボ
東京都品川区南大井6丁目28番10号

【製造販売元】

寧薬化学工業株式会社
奈良県大和高田市旭南町2番25号



SOCIA
ソシア製薬グループ

服用の際はこの説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

■ 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)高齢者。(4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(5)次の症状のある人。むくみ(6)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる。空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 3.1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 4.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

Made in Japan

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931



4 589818 161852

PE.PET.M
YM4080210601

使用期限

製造番号