



ここからハサミでお切りください。  
開封後は、湿らないようにチャックを合わせて端からしっかりと押させてください。

服用の際はこの説明文を必ずお読みください。必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品 【販売名】千燃之才錠 漢方製剤

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(5) 次の症状のある人。むくみ(6) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする、息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

**効能・効果** 体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症: 肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶどう)【用法・用量】大人15歳以上、1回4錠を1日3回、食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。15歳未満は、服用しないでください。【用法・用量に関する注意】(1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 食間とは食後2~3時間を目指します。【成分・分量】1日量(12錠)3,000mg中、防己黄耆湯乾燥エキス(「漢方入門講座」1/2量)…2,025mg ボウイ2.0g、オウギ2.5g、ヒヤクジュツ1.5g、ショウキョウ0.5g、タイソウ2.0g、カンゾウ1.0gより抽出。添加物として、乳糖水和物、セルロース、ケイ酸AI、ステアリン酸Mg、カルメロースCa、マクロゴールを含有する。【成分に関する注意】本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。【保管及び取扱い上の注意】1. 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所にチャックを閉じて保管してください。2. 小児の手の届かない所に保管してください。3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になり品質が変わることがあります)4. 水分が錠剤につきますと、変色など品質に影響を与える場合があるので、ぬれた手で触れないでください。5. 吸湿しやすいため、服用の都度チャックをしっかり閉じてください。6. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。7. 袋の中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。

発売元 株式会社だいにち堂 製造販売元 寧薬化學工業株式会社  
長野県安曇野市穂高柏原2843-28 奈良県大和高田市旭南町2番25号  
副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931 本製品についてのお問い合わせは、  
下記にお願い申し上げます。

だいにち堂 問合せ先 [電話] 0120-315-531  
月～金 9:00～12:00, 13:00～18:00

PE,PET,M OS3825221207  
MADE IN JAPAN