

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

メグリエールW

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「金匱要略」に記載されている防己黃耆湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のたるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合も服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

色白で疲れやすく、汗のかきやすい傾向のある次の諸症：肥満症（筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり）、関節痛、むくみ。

【用法・用量】

下記の量を食前又は食間に水又は湯温にて服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回	7才未満4才以上	1/2包	3回
15才未満7才以上	2/3包		4才未満2才以上	1/3包	
			2才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】

[本品1日量3包(1包1.5g)中]

日本薬局方 ポ ウ イ……………2.50g	日本薬局方 ショウキョウ……………0.50g
日本薬局方 オ ウ キ……………2.50g	日本薬局方 タイソウ……………1.50g
日本薬局方 バクジュツ……………1.50g	日本薬局方 カンソウ……………0.75g
	より製した水製乾燥エキス……………1.6g

添加物として、乳糖、メタケイ酸アルミン酸Mg、部分アルファ化デンプン、ステアリン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。
- 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なる場合がありますが、効果には変わりありません。



本製品についてのお問合せは下記にお願い申し上げます。

源平製薬株式会社「ご注文・お問合せ窓口」

電 話 0120-108-051

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



発売元

源平製薬株式会社

〒939-0311 富山県射水市黒河新2643

製造販売元

東洋漢方製薬株式会社

〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号