



中国の民間説話「白蛇伝」に登場する女性を伝統的な漢方のイメージとしてシンボルマークとしたものです。

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

商品番号

TO03

## おなかに脂肪が多い方の 肥満症・便秘に

### 防風通聖散エキス錠N「コタロー」

本剤は、便秘を改善し、排尿、発汗を促して体内の老廃物を取り去る効果があります。これらにより体調を整え、脂肪が多い肥満体質を改善する処方です。

防風通聖散エキス錠N「コタロー」は、便秘がちで、特に腹部の皮下脂肪が厚い脂肪太りの方に用いられ、また同時に高血圧に伴う症状がある場合にも効果があります。



#### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
その他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症*	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。*

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

下痢、便秘

4. 1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください  
 5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

### 【効能・効果】

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：  
 肥満症、高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）

### 【用法・用量】

食前または食間に服用してください。  
 食間とは……食後2～3時間を持ちます。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	4錠	3回
15歳未満7歳以上	3錠	
7歳未満5歳以上	2錠	
5歳未満	服用しないでください	

### 【用法・用量に関する注意】

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。


### 【成分・分量】

成分・分量（本剤12錠中）					
トウキ	0.6g	ショウキョウ	0.15g	ビャクジュツ	1.0g
シャクヤク	0.6g	ケイガイ	0.6g	キキョウ	1.0g
センキュウ	0.6g	ボウフウ	0.6g	オウゴン	1.0g
サンシシ	0.6g	マオウ	0.6g	カンゾウ	1.0g
レンギョウ	0.6g	ダイオウ	0.75g	セッコウ	1.0g
ハッカ	0.6g	無水ボウショウ	0.35g	カッセキ	1.5g
より抽出した防風通聖散エキス散(1/2量)3.60gを含有しています。					

添加物としてカルメロースカルシウム、含水二酸化ケイ素、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプンを含有しています。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
 (2)小児の手の届かない所に保管してください。



(3)他の容器に入れ替えないでください。

（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）

- (4)ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠剤の色や形が変わる原因になります。


(5)ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で錠剤の品質が変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。

- (6)ビンの中の詰めものは、フタを開けた後はすぐしてください。

（詰めものは、輸送中に錠剤が破損することを防ぐためのものですが、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原因になります）

- (7)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。

(8)箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがあります、品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。  
 小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室  
 大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106  
 受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)



漢方薬ガイド  
請求券  
左のシールをハガキに貼って、お買求めの店名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、症状をお書きそえのうえ、お申込みください。（漢方薬と食薬を詳しく説明した、パンフレットをお送りいたします。）



製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に

小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号

TEL 06 (6371) 9106

<http://www.kotaro.co.jp/>

A3021