

脂肪の分解・燃焼を促します

満量処方
5500mg

肥満症・便秘・むくみ

おなか
に溜まった
脂肪
を減らす

漢方製剤 防風通聖散錠

サンスラットEX錠

第2類医薬品 225錠

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く便秘がちな方の肥満症、肥満に伴う便秘・むくみなど




においの少ない

飲みやすい

フィルムコート錠



切り取り線



開封後はチャックをしっかり閉めて保管してください

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。又、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名：サンスラットEX 225錠

第2類医薬品

△使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

👤 **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、激しい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
その他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢、便秘
4. 1ヵ月位(便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能又は効果】

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症

【用法及び用量】

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

成人(15歳以上)1回5錠、15歳未満7歳以上1回3錠、7歳未満5歳以上1回2錠、5歳未満は服用しないこと

<用法及び用量に関連する注意>

(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分及び分量】

サンスラットEXの1日量(15錠)中には下記生薬から得た防風通聖散エキス5500mgを含む。

トウキ・シャクヤク・センキュウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ポウフウ・マオウ…各1.2g、ダイオウ…1.5g、無水ポウショウ…0.75g、ショウキョウ…0.4g、ビャクジュツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ…各2.0g、カッセキ…3.0g

添加物として、無水ケイ酸、タルク、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウを含有する。

【保管及び取扱上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかり閉めて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)水分が錠剤につきますと、変色又は色むらを生じることがありますので、水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

販売元 サンドラッググループ

お問い合わせ先

製造販売元 大峰堂薬品工業株式会社
奈良県大和高田市根成柿574

消費者相談窓口 電話 0745-22-3601
受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

製造番号

使用期限



PE,金属