

ご使用に際して、この添付文書を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管してください。

第2類医薬品 漢方製剤 ラーメンドF

【特徴】

- 18種類の生薬を使用した、防風通聖散乾燥エキスを配合。
- 「防風通聖散」は中国の医書「宣明論」に記載されている漢方処方です。
- 肥満症、高血圧の随伴症状(どうき、肩こり、のぼせ)、便秘、むくみを改善してくれる効果があります。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (5) 発汗傾向の著しい人
 - (6) 高齢者
 - (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (8) 次の症状のある人
むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害



2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
そ の 他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つぼり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢・便秘
4. 1ヵ月位(便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 長期運用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症

【用法・用量】

次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人15歳以上	4 錠	3 回
15歳未満	服用しないでください	

- 定められた用法・用量を守ってください。
- 食間とは……「食事と食事の間」を意味します。食後約2時間のことをいいます。

【成分・分量】

大人1日の服用量12錠(1回4錠)中、次の成分を含んでいます。

防風通聖散乾燥エキス(1/2量)……………1.52g

〈原生薬換算量〉

トウキ …………… 0.6g	シャクヤク…………… 0.6g
センキュウ …………… 0.6g	サンシシ…………… 0.6g
レンギョウ …………… 0.6g	ハッカ…………… 0.6g
ショウキョウ …………… 0.2g	ケイガイ…………… 0.6g
ポウフウ …………… 0.6g	メオウ…………… 0.6g
ダイオウ …………… 0.75g	ポウショウ…………… 0.75g
ビャクジュツ…………… 1.0g	キキョウ…………… 1.0g
オウゴン…………… 1.0g	カンゾウ…………… 1.0g
セッコウ…………… 1.0g	カッセキ…………… 1.5g

添加物として乳糖水和物、セルロース、ケイ酸Al、ステアリン酸Mg、マクロゴール、カルメロースCaを含有する。

【成分に関する注意】

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

【保管及び取り扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えしないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
4. 容器の中の詰め物は、破損防止用ですので開封後は捨ててください。
5. 吸湿しやすいため、服用のつど容器のキャップをしっかりと閉めてください。
6. 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。



【お問い合わせ】

寧薬化学工業株式会社
相談窓口 ☎ 0745-22-4151
9:00~16:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **寧薬化学工業株式会社**
〒635-0035 奈良県大和高田市旭南町2番25号