

脂肪を分解・燃焼させる、飲んで効く漢方

富山常備薬

セルフメディケーション

税 控 除 対 象

15日分 180錠 リョウシンの 肥満症

防風通聖散

肥満症・便秘・むくみ

ぼうふうつうしょうさん

お腹周りの 余分な 脂肪を落とす

生活習慣などによる 肥満症、便秘・むくみに

※肥満に伴う便秘・むくみ

【効能・効果】体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：肥満症、高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）

《販売名》防風通聖散料エキス錠「寧薬」

第2類医薬品

ここからハサミでお切りください。

開封後は、湿らないようにチャックを合わせて漏れからしっかり弁を閉めてください。

服用前に、この説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに大切に保管してください。

使用上の注意

❌ **してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。【他の瀉下薬（下剤）】

2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

■ **相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1) 医師の治療を受けている人(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人(5) 発汗傾向の著しい人(6) 高齢者(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人(8) 次の症状のある人：むくみ、排尿困難(9) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能亢進症 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、げげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
その他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、三オパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸管運動調節硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。【下痢・便秘】 4. 1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【成分・分量】大人1日の服用量12錠（1回4錠）中、次の成分を含んでいます。防風通聖散乾燥エキス（1/2量）1.52g
<原薬換算量> トウキ0.6g、シャクヤク0.6g、センキュウ0.6g、サンシシ0.6g、レンギョウ0.6g、ハッカ0.6g、ショウキョウ0.2g、ケイガイ0.6g、ボウフウ0.6g、マオウ0.6g、ダイオウ0.75g、ボウショウ0.75g、ビャクジュツ1.0g、キキョウ1.0g、オウゴン1.0g、カンゾウ1.0g、セッコウ1.0g、カッセキ1.5g ※添加物として乳糖水和物、セルロース、タイ酸Al、ステアリン酸Mg、マクロゴール、カルメロースCaを含有する。<成分に関する注意> 本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

【用法・用量】次の量を食前又は食後に水又はお湯で服用してください。

大人15歳以上…1回4錠（1日3回）、15歳未満…服用しないでください

定められた用法・用量を守ってください。食間とは「食事と食事の間」を意味します。食後約2時間のことをいいます。

【保管及び取扱い上の注意】(1) 直接日光の当たらない湿気の少ない涼しいところにチャックを閉じて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(換用の原因になったり品質が変わることがあります)(4) 水分が錠剤につきまると、発色など品質に影響を与える場合があるので、濡れた手で触れないでください。(5) 吸湿しやすいため、服用の都度チャックをしっかりと閉じてください。(6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(7) 袋の中に乾燥剤が入っています。食べないでください。

製造販売元 寧薬化学工業株式会社
奈良県大和郡田市増田町2番25号
発 売 元 株式会社富山常備薬
富山県富山市丸の内1-8-17

お問い合わせ先 株式会社富山常備薬
☎0120-309-093 受付時間：9時～18時（年中無休）
●副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

使用期限

製造番号



4580544061461

MADE IN JAPAN YM4342251217