

漢方薬

540錠

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

販売名：ホノミサンイン錠

第2類医薬品

【成分・分量】 1日量18錠(3.6g)中
(オウゴン1.0g・カッセキ1.5g・カンゾウ1.0g・キキョウ1.0g・ケイガイ0.60g・サンシシ0.60g・シャクヤク0.60g・ショウキョウ0.20g・セツコウ1.0g・センキュウ0.60g・ダイオウ0.75g・トウキ0.60g・ハッカ0.60g・ビャクジュウ1.0g・ボウショウ0.75g・ボウフウ0.60g・マオウ0.60g・レンギョウ0.60g)防風通聖散エキス(1/2量)2.0g
添加物としてカルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖を含有する。

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることや、また天然生薬色素により容器・包装等が黄味を帯びることがあります。効果に変わりはありません。

【用法・用量】 次の量を食前又は食間^注に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

注「食間」とは食後2~3時間を指します。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	6錠	
15歳未満7歳以上	4錠	
7歳未満5歳以上	3錠	
5歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関する注意>

(1)用法・用量を厳守すること (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用されること

△使用上の注意

☒ [してはいけないこと]
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

☒ [相談すること]
1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人: むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、(ば)しい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
その他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢、便秘
4. 1ヵ月位(便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



【機能・効果】 体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症: 高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

発売元

昭和化学工業株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町大原市場157

問合せ先 0748-64-9040

(お電話でのお問い合わせ受付時間(平日)09:00~17:00)

製造販売元

剤盛堂薬品株式会社

和歌山市太田二丁目8番31号

製造番号

使用期限

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
0120-149-931(フリーダイヤル)

