

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要なときに読めるよう、大切に保管してください。

漢方製剤

第2類医薬品

ジーフェルスリムA

「ジーフェルスリムA」は、中国の医書「宣明論」に記載されている代表的な漢方処方「防風通聖散」に基づき漢方製剤です。腹部に脂肪の多い人、便秘がちな人に適しています。

してはいけないこと

- ⊗ (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
 - 他の瀉下薬(下剤)。
- 2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊娠又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5) 発汗傾向の強い人。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。
 - むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。
 - 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
その他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしただけで息切れがする・息苦しくなる、空咳、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
固アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこぼりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- * 腸閉塞(腸硬化症) 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。
- 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 4. 1ヶ月位(便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 5. 長期服用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

体力充実に、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：
高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症

【用法及び用量】

下記の量を1日3回食前又は食間に、水又は白湯で服用すること。

成人(15歳以上)	1回4錠	15歳未満7歳以上	1回3錠
7歳未満5歳以上	1回2錠	5歳未満は服用しないこと	

※食間とは食後約2時間のことを行います。

<用法及び用量に関連する注意>

- (1) 用法及び用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分及び分量】1日量(12錠)中

トウキ	0.6g	ショウキョク	0.2g	ビャクジュツ	1.0g
ジャクヤク	0.6g	ケイカイ	0.6g	キキョウ	1.0g
センキョウ	0.6g	ボウフウ	0.6g	オウゴン	1.0g
サンシ	0.6g	マオウ	0.6g	カンゾウ	1.0g
レンキョウ	0.6g	ダイオウ	0.75g	セッコウ	1.0g
ハツカ	0.6g	無水ボウショウ	0.375g	カッセキ	1.5g

上記生薬から得た防風通聖散エキス(1/2量)2750mgを含む。添加物として、含水二酸化ケイ素、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に、キャップをきちんと閉めて外箱に入れて保管すること。
- (2) お子様の手の届かない所に保管すること。
- (3) 服用を止む、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
- (4) ビン中の詰物は、錠剤の破損を防ぐために入れてありますので、開栓後は捨てること。
- (5) この文書は、本剤の使用の際に必要な注意事項などが記載されていますので、ビンと一緒に外箱に入れて保管すること。
- (6) 表示の期限を過ぎた製品は、服用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。

【その他】

本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、錠剤の色が多少異なることや、開栓後に吸湿した場合は錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。

本製品についてのお問い合わせはお買上のお店、又は下記までお願い申し上げます。
 中村薬品工業株式会社 お客さま相談窓口
 〒635-0121 奈良県高市郡高取町大字丹生谷31-32
 電話 0745-67-0038 FAX 0745-67-1438
 受付時間 10:00~16:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

中村薬品工業株式会社