

漢方葉

ぼうふうつうじょうさん
防風通聖散エキス錠[大峰]**【使用上の注意】****してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
他の瀉下薬（下剤）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。

**相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- 医師の治療を受けている人。
- 妊娠又は妊娠していると思われる人。
- 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- 発汗傾向の著しい人。
- 高齢者。
- 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の症状のある人。むくみ、排尿困難
- 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
その他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
* 腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。下痢、便秘
- 1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【成分・分量】 本品 1 日量 (12錠) 中

「日局」トウキ..... 0.6 g	「日局」マオウ..... 0.6 g
「日局」シャクヤク..... 0.6 g	「日局」ダイオウ..... 0.75 g
「日局」センキュウ..... 0.6 g	「日局」無水ボウショウ..... 0.375 g
「日局」サンシシ..... 0.6 g	「日局」ビャクジュツ..... 1.0 g
「日局」レンギョウ..... 0.6 g	「日局」キキヨウ..... 1.0 g
「日局」ハツカ..... 0.6 g	「日局」オウゴン..... 1.0 g
「日局」ショウキヨウ..... 0.2 g	「日局」カンゾウ..... 1.0 g
「日局」ケイガイ..... 0.6 g	「日局」セツコウ..... 1.0 g
「日局」ボウフウ..... 0.6 g	「日局」カツセキ..... 1.5 g

上記生薬より得た防風通聖散エキス(1g量)2750mgを含みます。

なお、添加物としてステアリン酸Mg、カルメロースCa、二酸化ケイ素を含みます。

【効能・効果】 体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症

【用法・用量】 次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。
(食間とは、食後2~3時間を指します。)

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	4 錠	
15歳未満 7歳以上	3 錠	3 回
7歳未満 5歳以上	2 錠	
5歳未満	服用しないで下さい	

【用法・用量に関する注意】

- 用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出ることがありますが、効果には変わりがありませんので安心して服用して下さい。

【お問い合わせ先】 伸和製薬株式会社 情報管理室

〒116-0003 東京都荒川区南千住5丁目17番8号

電話 : 03(3807)3780

受付時間 : 9時から17時まで（土・日曜、祝日を除く）

販 売 元 **日邦薬品工業株式会社**

東京都渋谷区代々木3丁目46番16号

<http://www.nippo-yakuhin.jp/>



発 売 元 **伸和製薬株式会社**

東京都荒川区南千住5丁目17番8号



製造販売元 **大峰堂薬品工業株式会社**

奈良県大和高田市根成柿574番地