

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。  
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

# ビナSLM

第2類医薬品

“ビナSLM”は漢方の古典「宣明論」をもとにした処方で、腹部に皮下脂肪が多く便秘がちな方に適し、排便や排尿、発汗を促して体内の脂肪と水分をとる作用があるため、肥満症、むくみ、高血圧の随伴症状（どうき、肩こり、のぼせ）、便秘に効果があります。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)
1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の瀉下薬（下剤）
  2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

### 🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - (4)腎臓が弱く下痢しやすい人。
  - (5)発汗傾向の著しい人。
  - (6)高齢者。
  - (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (8)次の症状のある人。：むくみ、排尿困難
  - (9)次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病、中状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい	そ の 他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間 質 性 肺 炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
下痢、便秘
4. 1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 【効能・効果】

腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなもの次の諸症：高血圧の随伴症状（どうき、肩こり、のぼせ）、肥満症、むくみ、便秘。

### 【用法・用量】

下記の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回
15才未満	服用しないこと	

### 【成分・分量】 【本品1日量3包（1包2.0g）中】

日本薬局方 トウキ	0.60g	シヤクヤク	0.60g
日本薬局方 センギョウ	0.60g	サハシ	0.60g
日本薬局方 レンギョ	0.60g	ハツシ	0.60g
日本薬局方 ショウキョ	0.60g	ケイガイ	0.60g
日本薬局方 ホウフ	0.60g	マケイ	0.60g
日本薬局方 ダイヤオ	0.75g	ボウシヨ	0.75g
日本薬局方 ビャクジュン	1.00g	キョウシ	1.00g
日本薬局方 オウゴン	1.00g	カクセン	1.00g
日本薬局方 セッコウ	1.00g	カッセキ	1.50g
			3.00g

より製した水製乾燥エキス  
添加物として、乳糖・メタケイ酸アルミン酸Mg・部分アルファー化デンプン・ステアリン酸Mgを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に使用すること。
- (5)本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。



### 【問い合わせ先】

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。  
東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」  
電話 0120-00-1040  
受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先  
（独）医薬品医療機器総合機構  
電話 0120-149-931