

ほちゅうえつきとう
補中益気湯 A エキス細粒「分包」 三和生薬

補中益気湯 A エキス細粒「分包」三和生薬は、漢方処方「補中益気湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
間 質 性 肺 炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1 ヶ月位（感冒に服用する場合には 5～6 日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	1 包
7 才～14 才	2/3 包
4 才～ 6 才	1/2 包
4 才 未 満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品 1 日量 …………… 3 包（1 包 2.0 g）中
補中益気湯エキス（7/10 量）…………… 3.7 g

ニンジン …………… 2.80 g	タイソウ …………… 1.40 g
ビャクジュツ …………… 2.80 g	ショウキョウ …………… 0.35 g
オウギ …………… 2.10 g	サイコ …………… 1.40 g
トウキ …………… 2.10 g	カンゾウ …………… 1.05 g
チンピ …………… 1.40 g	ショウマ …………… 0.70 g

上記の生薬より抽出したエキス

添加物として乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸 Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 1 包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用すること。

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

* 消費者くすり相談室 TEL 0570-095770
10:00～17:00（土、日、祝日を除く）

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果には変わりございません。

適応症

体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症：

虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒



三 和 生 薬 株 式 会 社
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1

第2類医薬品

補中益気湯Aエキス細粒
「分包」三和生薬

補中益気湯Aエキス細粒「分包」三和生薬は、漢方処方「補中益気湯」の生薬エキスを服用しやすい単位「分包」にしたものです。

使用上の注意

●相対すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
むくみ
(6) 次の影響を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

服用部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症状
間質性肺炎	胸膈を上ったり、少し無呼吸をきたしたりと息切れがする、息苦しくなる、発熱、発汗等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のふるえ、しびれ、つらばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発赤、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、尿色変、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月(感管に服用する場合は5〜6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期服用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果には変わりございません。

製造番号

使用期限

製造販売元

三和生薬株式会社

栃木県宇都宮市平出工業団地6-1



開封口

ご使用に際しては、説明文を必ずお読み下さい。
また、必要な時に認めるように保管して下さい。

適応症

体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症：
虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食後に服用すること。

年令	1回量
大人(15才以上)	1包
7才〜14才	2/3包
4才〜6才	1/3包
4才未満	服用しないこと

(用法・用量に関連する注意)

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分

本品1日量………3包(1包2.0g)中
補中益気湯エキス(7/10煎)………3.7g

ニンジン………2.80g	タイソウ………1.40g
ビャクジョウ………2.80g	ショウキョウ………0.35g
オウゴン………2.10g	サイ………1.40g
トウモロコシ………2.10g	カンゾウ………1.05g
チン皮………1.40g	ショウマ………0.70g

上記の生薬より抽出したエキス

添加物として乳糖、セルロース、部分アルブミン化デンプン、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(4)包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

消費者くすり相談室 電話 0370-096770

10:00〜17:00(土、日、祝日を除く)

副作用報告救済制度 電話 0120-149-931

10COINSKAMPO

ほちゅうえつきとう
補中益気湯

15包

第2類医薬品

MA

虚弱体質、
疲労倦怠、病後・術後の衰弱、
食欲不振に

ほちゅうえつきとう
補中益気湯

補中益気湯
ほちゅうえつきとう

細粒
タイプ

細粒
タイプ

補中益気湯
ほちゅうえつきとう

第2類医薬品

15包
(5日分)

10COINSKAMPO

15包(5日分) 第2類医薬品

15包
(5日分)

第2類医薬品



4 987327 100674