



90錠

開け口

開け口

販売名：薬王補中益気湯エキス錠 漢方製剤 第2類医薬品

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。使用期限(パッケージ下部に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりしめてください。



△ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
[関係部位・症状]皮膚：発疹・発赤、かゆみ  
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。  
[症状の名称・症状]間質性肺炎：階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
- 1ヵ月位(感冒に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■ 効能・効果

体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症：疲労倦怠、虚弱体質、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒

■ 用法・用量

次の量を、食前または食間に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	6錠	3回
7歳以上15歳未満	4錠	
5歳以上7歳未満	3錠	
5歳未満	服用しないこと	

<用法に関連する注意>

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)食間とは食後2~3時間を指します。

■ 成分・分量 (成人の1日量18錠中) 補中益気湯エキス(11/20量) ..... 2.87g  
[ニンジン・ビャクジュツ・オウギ各2.2g、トウキ1.65g、チンピ・タイソウ・サイコ各1.1g、カンゾウ0.825g、ショウキョウ] 0.275g、ショウマ0.55g

添加物として、カルメロースカルシウム、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、ステアリン酸を含有する。

<成分に関連する注意>

- (1)本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)本剤をぬれた手で扱わないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



使用期限

製造番号

製造販売元

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931

MADE IN JAPAN

薬王 薬王製薬株式会社  
奈良県磯城郡田原本町245  
製品のお問い合わせ先(お客様相談室)  
☎0744-33-8855  
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)