

第2類医薬品

販売名：
アトラスミン麻黄湯液

開け口

用法・用量

次の量を、食前又は食間によく振ってから服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15才以上)	1本(30mL)	1日3回
15才未満	服用しないこと	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後のことです。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。(2)本剤は1回1本飲みきりです。(3)本剤は本質的に沈殿を含んでいますので、よく振ってから服用してください。

効能

体力充実して、かぜのひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないもの次の諸症：感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

成分・分量 1日量 90mL(30mL×3本)中

麻黄湯エキス……………2.21g
〔マオウ5g、キョウニン5g、ケイヒ4g、カンゾウ〕
1.5gより抽出。

添加物：キシリトール、スクラロース、D-ソルビトール、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、アルコール、香料

使用期限

製造番号

MADE IN JAPAN

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう商品と共に大切に保管してください。

使用上の注意

※してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
2. 短期間の服用にとどめ、連用しないこと

※相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)胃腸の弱い人。(4)発汗傾向の著しい人。(5)高齢者。(6)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(7)次の症状のある人。むくみ、排尿困難(8)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
その他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位(感冒、鼻かぜに服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。(5)生薬成分による沈殿物が瓶口に付着しますので、瓶を横にして保管しないでください。

満量処方

眠くなる成分は入っていません

麻黄湯液

かぜのひきはじめに

第2類医薬品

製造販売元
小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中錦1丁目139番地

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室

電話：0120-584-419

受付時間：10時～16時(土、祝日を除く)