第2類医薬品

阪本漢法の麻黄湯（まおうとう） 顆粒

眠くなる成分は入っていません

ふしぶしの痛み、
鼻かぜ、発熱、
さむけのある感冒に



有効成分
そのまま！

飲みやすくなりました
（1包あたり3g→1g）

満量処方

日本薬局方 麻黄湯エキスの
1日最大量15.5gの生薬から
抽出して得られたエキスを
全量配合した顆粒剤

【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4)湿気などにより薬が固化することがありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】☎ 06-6423-0565
（祝日を除く月～金曜日10:00～17:00）

【製造販売元】
株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1－5－12
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

顆粒 阪本漢法の麻黄湯（まおうとう）

満量処方

セルフメディケーション 税控除対象

9包

第2類医薬品

眠くなる成分は入っていません

ふしぶしの痛み、発熱、
さむけのある感冒、鼻かぜに

4 987076 627507

製造番号 [redacted]

使用期限

プラ 袋：PE、金属

紙 箱

漢方製剤
この箱は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。 第2類医薬品

【販売名】阪本漢法の麻黄湯顆粒

【効能・効果】
体力充実して、かぜのひきはじめで、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

【用法・用量】
1日3回食前又は食間に水かお湯で服用してください。

年　齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1包	1日3回
7歳以上　15歳未満	2／3包	
4歳以上　7歳未満	1／2包	
4歳未満	服用しないでください	

※食間とは食後 2～3 時間を指します。

<用法・用量に関連する注意>
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】
成人1日量3包(1包1.0g)中　日局 麻黄湯エキス 1.92g

成　分	分 量	成　分	分 量
日局 マオウ	5g	日局 ケイヒ	4g
日局 キョウニン	5g	日局 カンゾウ	1.5g

より製した乾燥エキス
添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム
※本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

S3

押して開ける

⚠使用上の注意

☒してはいけないこと
（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
1. 次の人は服用しないこと　体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
2. 短期間の服用にとどめ、連用しないこと

相談すること
1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)胃腸の弱い人
(4)発汗傾向の著しい人
(5)高齢者
(6)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
(7)次の症状のある人：むくみ、排尿困難
(8)次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
その他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症　状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位(感冒、鼻かぜに服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

満量処方

DAIKOKU

麻黄湯（まおうとう）

顆粒

ふしぶしの痛み・さむけ
発熱のかぜに

体力充実して、かぜのひきはじめで、さむけ、
発熱、頭痛やせきがあり、汗が出ない方に

第2類医薬品

セルフメディケーション
税控除対象

漢方製剤
第2類医薬品

この箱は本剤とともに保管し、
服用の際にはよくお読みください。

【販売名】 阪本漢法の麻黄湯顆粒

【効能・効果】
体力充実して、かぜのひきはじめで、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

【用法・用量】
1日3回食前又は食間に水かお湯で服用してください。

年　齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1包	1日3回
7歳以上　15歳未満	2／3包	
4歳以上　7歳未満	1／2包	
4歳未満	服用しないでください	

※食間とは食後 2～3 時間を指します。

<用法・用量に関連する注意>
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】
成人1日量3包（1包1.0g）中　日局 麻黄湯エキス 1.92g

成　分	分量	成　分	分量
日局 マオウ	5g	日局 ケイヒ	4g
日局 キョウニン	5g	日局 カンゾウ	1.5g

より製した乾燥エキス

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

※本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

押して開ける

⚠使用上の注意

☒してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないこと
   体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
2. 短期間の服用にとどめ、連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
   (1)医師の治療を受けている人
   (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
   (3)胃腸の弱い人
   (4)発汗傾向の著しい人
   (5)高齢者
   (6)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
   (7)次の症状のある人
   むくみ、排尿困難
   (8)次の診断を受けた人
   高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
その他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症　状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位（感冒、鼻かぜに服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

体力充実してかぜのひきはじめで
さむけ・発熱・ふしぶしが痛い方の感冒、鼻かぜ

第2類医薬品

麻黄湯（まおうとう）
顆粒

満量処方

日本薬局方 麻黄湯エキスの1日最大量15.5gの生薬から抽出して得られた乾燥エキスを全量配合した顆粒剤

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4) 1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565
（祝日を除く月～金曜日10:00～17:00）

【製造販売元】 株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1－5－12

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

麻黄湯（まおうとう）

満量処方

ふしぶしの痛み・さむけ 発熱のかぜに

体力充実して、かぜのひきはじめで、さむけ、発熱、頭痛やせきがあり、汗が出ない方に

第2類医薬品

セルフメディケーション 税控除対象

顆粒

漢方製剤

この箱は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

第2類医薬品

【販売名】 阪本漢法の麻黄湯顆粒

【効能・効果】

体力充実して、かぜのひきはじめで、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

【用法・用量】

1日3回食前又は食間に水かお湯で服用してください。

年　齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1包	1日3回
7歳以上　15歳未満	2／3包	
4歳以上　7歳未満	1／2包	
4歳未満	服用しないでください	

※食間とは食後 2～3 時間を指します。

<用法・用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

成人1日量3包(1包1.0g)中　日局 麻黄湯エキス 1.92g

成　分	分量	成　分	分量
日局 マオウ	5g	日局 ケイヒ	4g
日局 キョウニン	5g	日局 カンゾウ	1.5g

より製した乾燥エキス

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

※本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

押して開ける

⚠使用上の注意

☒してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないこと　　体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
2. 短期間の服用にとどめ、連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
   (1)医師の治療を受けている人
   (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
   (3)胃腸の弱い人
   (4)発汗傾向の著しい人
   (5)高齢者
   (6)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
   (7)次の症状のある人：むくみ、排尿困難
   (8)次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
その他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症　状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位（感冒、鼻かぜに服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

麻黄湯（まおうとう）

満量処方

第2類医薬品　**顆粒**

満量処方

日本薬局方 麻黄湯エキスの1日最大量15.5gの生薬から抽出して得られたエキスを全量配合した顆粒剤

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4) 湿気などにより薬が固化することがありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】☎ 06-6423-0565
（祝日を除く月～金曜日10:00～17:00）

【製造販売元】
株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1－5－12